



SEPTA SINE CID 1 / H1



Termékleírás

Alkohol alapú folyadék higiénikus kézfertőtlenítéshez. Hatékony a baktériumok, élesztőgombák és vírusok teljes spektruma ellen, beleértve a BVDV-t, norovírust, influenza A (H1N1), rotavírust, hepatitis B-t, HIV-t, MRSA-t és másokat. Közüzemi, kozmetikai, ételmeiszer- és egészségügyi iparágakban történő felhasználásra szánják. A biocid terméket különleges óvintézkedésekkel kell használni. Használat előtt olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót.

Elérhető kiszerelések: 0,5L, 1L, 5L

Technologia



Technika stosowania

GOTOWY DO UŻYCIA

Nanosić na czystą skórę dawkę nie mniejszą niż 3 ml preparatu. Wcierać intensywnie przez minimum 1 minutę. Stosować w miejscach mających dobrą wentylację.

Zagrożenia

Niebezpieczeństwo



Substancje czynne: Etanol [90 g/100 g]; **Środki ostrożności, pierwsza pomoc, przechowywanie:**
H225 - Wysokie łatwopalna ciecz i pary; **H319** - Działa drażniąco na oczy; **P210** - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 - Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy; **P305 + P351 + P338** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P403+P233** - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. **Wdychanie** - W razie narażenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzić/ wynieść na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską. **Skóra** - W razie podrażnienia, skórę płukać dużą ilością wody lub wody z mydłem. Zapewnić pomoc lekarską. **Połknięcie** - Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. **Skutki uboczne: Wdychanie** - Objawy podrażnienia dróg oddechowych (pieczenie, kaszel, trudności w oddychaniu). **Skóra** - Objawy zapalenia skóry (pieczenie, suchość, popękany wygląd skóry). **Połknięcie** - Objawy poparzenia przełyku (pieczenie, suchość, problemy z przełykaniem). **Oczy** - Objawy podrażnienia oczu (pieczenie, obrzęk, spadek ostrości widzenia).